


# XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA  
REUNIÓN  
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021



Minimizar  
mejorar  
**Avanzar**

# XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA  
REUNIÓN  
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021

Minimizar  
mejorar  
Avanzar

PÓSTER CON DEFENSA

**Artritis séptica de la sínfisis del pubis como  
causa de dolor abdominal**

Álvarez Triano M, Baquero Gómez C, Torres Rico M, Calzada García-Mora C, Pérez Hernández, A. *Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva.*

## CASO CLÍNICO

Paciente mujer de 12 años con fiebre de 1 semana de evolución + dolor abdominal y miembros inferiores.

- Ambiente epidémico: epidemia de gripe.
- No antecedentes personales ni familiares de interés.

**Exploración física:** BEG, BHyP, buena coloración del piel y mucosas. ACR normal. Abdomen depresible con dolor difuso a la palpación pero sin signos de peritonismo. Dolor en miembros inferiores sin afectación de la movilidad de la cadera.



1° PCR a gripe  
**NEGATIVA**

2° Analítica  
sanguínea

Empeoramiento clínico


13270 leucocitos a expensas  
de neutrófilos, bioquímica  
con enzimas hepáticas y CPK  
normales y PCR de 276 mg/l

Ante la **SOSPECHA DE BACTERIEMIA** se solicita HC, Rx tórax Eco abdominal y se inició ATB iv.



1

Rx tórax: normal



2


Eco abdomen: normal



Empeoramiento  
clínico

- Afectación del estado general
- Aumento dolor en región suprapúbica
- Dolor a la abducción de ambas caderas

Ante la **SOSPECHA DE FOCO ABDOMINAL RETROCECAL O POSIBLE ENFERMEDAD PÉLVICA DE ORIGEN GINECOLÓGICO** se decide realizar TAC abdomino-pélvico urgente con hallazgos compatibles con **ARTRITIS SÉPTICA DE LA SÍNFISIS DEL PUBIS.**



En la sínfisis púbica se observan irregularidades en las porciones inferiores de las superficies articulares con ligero ensanchamiento y presencia de un derrame articular de 47mm de diámetro máximo con abombamiento capsular periarticular. Hallazgos en probable relación con **ARTRITIS SEPTICA DE LA SINFISIS DEL PUBIS.**

## CONCLUSIONES

- 1 La artritis séptica de la sínfisis del pubis es una rara causa de dolor en área abdomino-pélvica.
- 2 Su diagnóstico se retrasa por la escasa frecuencia, la presentación variable y la baja sospecha clínica de esta entidad.
- 3 El diagnóstico está basado en clínicas y apoyada en pruebas complementarias.
- 4 El tratamiento antibiótico se dirige según el aislamiento microbiológico asociado a antiinflamatorios y reposo. A pesar de esto, más del 50 % de los casos requieren desbridamiento quirúrgico.