

XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA
REUNIÓN
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021



Minimizar
mejorar
Avanzar



XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA
REUNIÓN
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021

Minimizar
mejorar
Avanzar

PÓSTER CON DEFENSA

Trombosis de senos venosos...
¿Cuándo sospecharla?

Ferreiro-Mazón P, Calvo Fernández A, Chamorro Sanz N, Caballero Caballero JM, Martín Sánchez J, López López R.
Hospital Universitario La Paz, Madrid.



INTRODUCCIÓN

- La **trombosis cerebral de senos venosos** (TCSV) es la oclusión de venas cerebrales y/o senos dures.
- La clínica es **variable e inespecífica**, depende de la localización y la edad.
- La **incidencia** de TCSV en la infancia es extremadamente baja, pero presenta elevado riesgo de secuelas neurológicas.
- En un elevado porcentaje de TCSV se detecta un **factor de riesgo desencadenante**.

OBJETIVO

- Destacar la importancia de una detección temprana tanto de **factores de riesgo desencadenantes** como de **signos de alarma** en la exploración que permitan un diagnóstico precoz.



RESUMEN DEL CASO

Varón de 13 años.

Antecedente: trombocitemia esencial mut V617F gen JAK2.

Anamnesis: **cefalea continua** en región temporal de mes y medio de evolución.

EF: **edema de párpados bilateral + lagrimeo ocular y masa pulsátil en región occipital** sin más alteraciones significativas.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:



Análítica: 1.400.000 plaquetas, ↓ actividad de protrombina (54%).

Fondo de ojo: edema de papila IV bilateral.

RMN: hipodensidad en la confluencia de senos.

AngioRMN: trombosis de seno transversal izquierdo + HTIC.

Tratamiento con HBPM y acetazolamida.
Buena **evolución**, no secuelas neurológicas.



COMENTARIOS

- La **cefalea** es un síntoma común en pediatría, siendo la mayoría de las mismas de etiología benigna.
- Se debe considerar un diagnóstico de TCSV ante un paciente con clínica neurológica y **signos de alarma**, especialmente en aquellos con **factores de riesgo asociados**.
- Es importante establecer una **sospecha diagnóstica**, así como la realización de **pruebas complementarias adecuadas** para su diagnóstico que permitan establecer un **tratamiento precoz** para evitar así las **secuelas neurológicas** derivadas de la TCSV.

