

# XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA  
REUNIÓN  
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021



Minimizar  
mejorar  
**Avanzar**

# XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA  
REUNIÓN  
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021

PÓSTER SIN DEFENSA

Minimizar  
mejorar  
**Avanzar**

**Intoxicación por drogas ilegales, a propósito de un caso**

Sainz Villamayor Á, Santana Cabrera EM, Luz Romero R, Lopez-Seoane Puente FJ, Aleo Luján E, Joyanes Abancens B. *Hospital Clínico San Carlos. Madrid.*

# INTRODUCCIÓN

En los últimos años ha habido cambios en los patrones de consumo de alcohol y otras drogas de abuso con tendencia a la normalización en la población adolescente. En nuestro hospital vemos pacientes hasta los 18 años de edad. Actualmente atendemos a un importante número de adolescentes en nuestro Servicio de Urgencias y en planta de Hospitalización. El consumo en adolescentes no debe ser visto como un rito de transición, sino como un problema de salud pública. Además, no se debe olvidar la posibilidad de sumisión química.

# RESUMEN DEL CASO

- Varón 17 años de edad traído a urgencias ante sospecha de intoxicación voluntaria por drogas de abuso en una fiesta. Es traído por el SAMUR tras aviso por agitación psicomotriz, alucinaciones visuales y heteroagresividad.
- Ingesta en una fiesta de una infusión realizada con floripondio “brugmansia o trompeta de ángel” (escopolamina) y hachís.



# RESUMEN DEL CASO

## EXPLORACIÓN FÍSICA:

- A su llegada se encuentra taquicárdico y febril (Tº 41ºC). Consciente, desorientado, glasgow 10. Agitación psicomotriz importante, realiza movimientos como si estuviese fumando y quitándose cosas de encima. Midriasis arreactiva bilateral. Presenta piel seca, con mucosas secas.
- Resto de la exploración física normal.

## SALA AGUDOS:

- Se canalizan dos vías venosas periféricas: Expansión con volumen, se inicia oxigenoterapia con mascarilla, medidas físicas por la hipertermia y se administra midazolam.
- Analítica: leucocitosis y elevación de CK (378 U/L), resto normal.
- Radiografía de tórax: normal.
- Cannabis positivo en orina.

Intoxicación grave por escopolamina y cannabis  
Rabdomiólisis

UCIP

- Lavado gástrico
- **FISOSTIGMINA**

# COMENTARIOS

La escopolamina o burundanga es un **anticolinérgico** que actúa inhibiendo el sistema parasimpático bloqueando los receptores muscarínicos. Tiene acción sobre el sistema nervioso central y periférico y un efecto relajante sobre el músculo liso. En casos de intoxicación grave está indicado el tratamiento con **fisostigmina** que actúa como antídoto al inhibir la colinesterasa pudiendo revertir los efectos tanto a nivel central como periférico.

La intoxicación por drogas ilegales debe sospecharse ante cuadros inexplicables o que no responden a los tratamientos habituales y ante casos de alteración del nivel de conciencia. Es importante realizar una anamnesis detallada y una exploración física sistematizada.

En urgencias se realizará una estabilización inicial (**ABCDE**). En la primera hora se debe administrar carbón activado y si la intoxicación es susceptible de **antídoto**, administrarlo. La necesidad de pruebas complementarias se valorará de manera individualizada y el manejo es sintomático.