

XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA
REUNIÓN
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021



Minimizar
mejorar
Avanzar

XXV REUNIÓN SEUP

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021

PRIMERA
REUNIÓN
VIRTUAL

PÒSTER SIN DEFENSA

Minimizar
mejorar
Avanzar

Intoxicación por metadona: hasta cuándo?

Domènech Marcè, E; Callejo Barcelona N.; Susanna Calero, M; Gotor Gil, M; Rovira Girabal, N; Ripoll Trujillo, N.

Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. Fundació Althaia.

- La intoxicación por drogas en lactantes es afortunadamente un motivo de consulta poco frecuente en Urgencias.
- Su consumo suele ser accidental pero siempre tenemos que plantearnos si ha sido intencionado.
- A menudo la duración de sus efectos secundarios en niños es desconocida y requiere observación estrecha.

CASO CLÍNICO

Niño de 12 meses que es traído por probable ingesta de 30 mg de metadona en comprimido hace 30 minutos.

EXPLORACIÓN FÍSICA


- Alteración de la consciencia fluctuante
- Tendencia a la somnolencia y pupilas mióticas y arreactivas.
- Inquietud motriz con movimientos de flexoextensión de extremidades exagerados.
- Buen contacto visual. Resto, anodino.

CONSTANTES

- Hipoxemia por hipoventilación
- Que mejora con gafas nasales a 1 L/min.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Tira reactiva de orina con presencia de opiáceos y cocaína.



- Los resultados del análisis de orina confirman la presencia de opiáceos y cocaína.
- Se reinterroga a la familia acerca del consumo.
- El padre, en proceso de deshabituación, confiesa que ha recaído en el consumo de cocaína por lo que probablemente el niño la haya ingerido de forma accidental.

CONCLUSIONES

- ✓ La intoxicación por metadona en niños no es muy frecuente.
- ✓ Suele estar relacionado con la deshabitación de algún familiar.
- ✓ Dado que tiene amplio volumen de distribución su liberación es gradual y retardada.
- ✓ Su vida media es muy variable, entre 1 y 6 horas.
- ✓ Por lo que sus efectos secundarios son imprevisibles y requieren observación hasta su resolución total.
- ✓ Clínicamente se presenta con la tríada de depresión del sistema nervioso central, miosis y depresión respiratoria.
- ✓ A veces puede ser útil la infusión continua en bomba de naloxona endovenosa a 100 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{h}$.