


XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA
REUNIÓN
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021



Minimizar
mejorar
Avanzar

XXV REUNIÓN SEUP

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021

PRIMERA
REUNIÓN
VIRTUAL

Minimizar
mejorar
Avanzar

POSTER SIN DEFENSA

La importancia de la anamnesis en el adolescente

Silvera Roig P, Buitrago García V, Andreu Villalpando E, Ruiz Vicente A, Díaz-Delgado R, García García ML.

Hospital Universitario Severo Ochoa.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS



Los síntomas neurológicos en pediatría plantean un amplio diagnóstico diferencial. Este caso clínico destaca la importancia de descartar previamente la ingesta de fármacos como posible causa de los síntomas, sobre todo en la población adolescente.



MÉTODOS

Adolescente mujer de 15 años con **limitación en la infraversión de la mirada** de inicio súbito. Asociaba dolor a nivel cervical y **desviación cefálica** a la izquierda. Refería **dolor abdominal** a nivel epigástrico de 4 días de evolución en contexto de estreñimiento. Afebril, no presentaba cefalea ni otra sintomatología asociada. No presentaba episodios previos similares. A la exploración física destacaba un buen estado general sin otras alteraciones, con una exploración neurológica



Exploración física: destacaba un buen estado general sin otras alteraciones, con una exploración neurológica

Observación: inicia movimientos de contracción involuntaria de la musculatura paracervical, con desviación cefálica mantenida hacia la izquierda de unos 15 minutos de duración tras lo cual cede espontáneamente. Durante el episodio mantiene un nivel de consciencia normal y movimientos oculares no limitados



Ante el cuadro clínico establecido, **se vuelve a entrevistar a la paciente**, que describe finalmente que había estado tomando en domicilio Flatoril (Cleboprida/Simeticona), ingiriendo el triple de dosis de la indicada en ficha técnica, como remedio para la sintomatología digestiva previamente descrita.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

La distonia, dentro del síndrome extrapiramidal, es uno de los efectos adversos más frecuentes de los antagonistas dopaminérgicos como los antieméticos.

Es importante realizar una **óptima anamnesis** ante la existencia de sintomatología neurológica. El paciente pediátrico, al contrario del paciente adulto, presenta un reto mayor a la hora de realizar una adecuada historia sobre la ingesta de fármacos, especialmente en el paciente adolescente. Ante este tipo de cuadro clínico, es importante realizar una **historia clínica detallada con la ayuda del paciente y los tutores**, estableciendo todos los fármacos que hayan podido ser ingeridos. El objetivo es identificar la causa y poder aplicar un tratamiento dirigido (como los anticolinérgicos en este caso) en el menor tiempo posible

