


XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA
REUNIÓN
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021



Minimizar
mejorar
Avanzar

XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA
REUNIÓN
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021

Minimizar
mejorar
Avanzar

PÓSTER SIN DEFENSA

Consulta infrecuente en Urgencias: hipertrofia de labios menores



Servicio
Canario de la Salud

Espinel Padrón Z, del Pino Hernández I, García Luzardo S, Cervantes Chirino D, Fernández Ureña S, del Pino Castellano R.

Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Canarias. Las Palmas de Gran Canaria.



INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La hipertrofia de labios menores es una entidad poco frecuente, benigna, a la que no estamos familiarizados en los servicios de Urgencias Pediátricas.

Objetivos

Conocer esta entidad para reconocerla en nuestra actividad asistencial

Definición: variante anatómica, descrita como tejido protuberante que sobrepasa los labios mayores.

Etiología: desconocida. Cierta predisposición genética y racial.

Factores favorecedores: inicio temprano y frecuente de relaciones sexuales, uso de andrógenos en infancia y práctica de deportes que producen microtraumatismos locales (equitación, ciclismo, atletismo).

Epidemiología: cualquier edad. En la pubertad la detección es más frecuente.

Sintomatología: irritación local, infecciones crónicas, dolor al caminar, dispareunia o problemas psicológicos y estéticos.

Diagnóstico diferencial: hiperplasia suprarrenal congénita.

Tratamiento: técnicas quirúrgicas (labioplastia). No existe consenso a qué edad realizarla y la indicación precisa. Principal criterio: presencia de sintomatología que imposibilita el desarrollo de una vida normal y la problemática psicológico-estética.

MÉTODO

Descripción de un caso clínico y revisión de la literatura disponible.



Caso clínico

Acude a nuestro Servicio de Urgencias, hospital de tercer nivel, mujer de 13 años por bultoma en área genital.



Anamnesis

- **Antecedentes personales:** no menarquia. Intervenida de dermatofibroma
- **Motivo de consulta:** bultoma en área genital desde hace 14 días, asociado a flujo blanquecino no fétido y molestias leves con la actividad física. Al inicio del cuadro le pautaron clotrimazol, sin mejoría



Exploración física (a destacar)

- TEP estable. Genitales externos femeninos con hipertrofia del labio menor izquierdo que protruye por los labios mayores; labios mayores, clítoris, meato uretral, introito, periné y ano normales.
- Resto de la exploración normal

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

La hipertrofia de labios menores:

- Debemos familiarizarnos con esta entidad, que aunque benigna y de fácil diagnóstico en Atención Primaria, llega a los servicios de Urgencia Hospitalaria.
- Además de por la sintomatología que produce, hay un **número creciente** de adolescentes que **consultan por el aspecto de sus genitales externos**, debido probablemente a causa de los cambios sociales.
- Es un motivo de consulta cada vez más frecuente.

