


# XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA  
REUNIÓN  
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021



Minimizar  
mejorar  
**Avanzar**

# XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA  
REUNIÓN  
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021

PÓSTER SIN DEFENSA

**Eccema numular. Presentación atípica de dermatitis infantil**


Minimizar  
mejorar  
**Avanzar**

Torre Francisco R, Medina Castillo L, Paul López de Viñaspre M, Ladrón de Guevara Saiz AI, Hernández García B, Heras Sánchez E.  
*Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Madrid.*


## INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO:

### Eccema numular

- Patología poco frecuente en pediatría (Infradiagnosticada en menores de 5 años)
- Prevalencia 2/1000 casos a nivel mundial
- Discrepancia entre autores (*entidad propia vs forma atípica de dermatitis atópica*)
- Etiología desconocida
- Dx fundamentalmente clínico sin PPCC



# RESUMEN DEL CASO:



## Exploración física en Urgencias:

- Lesión sobreelevada 3-4 cm región central espalda, exudativa, friable, formada por pequeñas pápulas agrupadas, sin petequias, ampollas ni costras melicéricas.
- Segunda lesión, placa 1cm en escápula derecha y otras tres lesiones máculas satélites adyacentes a lesión principal.
- Asocia lesiones incipientes hipocrómicas en espalda superior. Resto sin hallazgos.

## Valoración Dermatología:

- TTO:** Antihistamínico 1º generación, emolientes, normas generales del cuidado piel y tto ATB-Corticoideo durante 2 semanas.
- Evolución:** Revisión 4-6 semanas, sin curación completa → **tto inmunomodulador tópico** con evolución posterior favorable.

## COMENTARIOS:

La descripción de este caso clínico pretende **difundir el conocimiento** de esta presentación tan infrecuente de la dermatitis atópica **entre los pediatras**.



Diagnóstico  
puramente clínico

Placa exudativa forma discoide y evoluciona a eccematosa/liquenificada.  
Aparición en zonas extensoras de extremidades, puede localizarse en tronco.

### Base del tratamiento:

- Rehidratar piel y reparar barrera epidérmica
- Reducir inflamación mediante tto tópico y tratar la sobreinfección.

Evolución crónica o recidivante. --- > **Derivación a Dermatología Infantil**