

# XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA  
REUNIÓN  
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021



Minimizar  
mejorar  
**Avanzar**

# XXV REUNIÓN SEUP

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021

PRIMERA  
REUNIÓN  
VIRTUAL

Minimizar  
mejorar  
Avanzar

PÓSTER SIN DEFENSA

## Un bulto en el cuello, ansiedad y miedo.

Autores:

Álvarez Rolo, AK;      Díaz Martín, S;  
Rodríguez Lorenzo, T;      Duque González, S;  
Papoyán Zapatero, R;      Alventosa Fernández, E.


*Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Tenerife*

# Introducción y Objetivos

Las tumoraciones cervicales son frecuentes en niños, y pueden ser causadas entre otras cosas por la presencia de una **costilla cervical**.



Consiste en una costilla supranumeraria que surge de la séptima vertebra cervical.



Puede ser **asintomática** y ser un hallazgo casual en una radiografía de tórax.



Puede presentarse también con **dolor** en la region supraclavicular o complicación en forma del **síndrome del desfiladero torácico**.



El manejo suele ser conservador.  
El tratamiento quirúrgico se reserva para casos sintomáticos o complicados.

# Métodos / Caso Clínico



Niña de 4 años que acude al servicio de urgencias por fiebre y decaimiento de tres días de evolución.

## Exploración Física:

Tumoración supraclavicular derecha de aproximadamente 2 centímetros, de consistencia dura, inmóvil y adherida.

## Radiografía clavicular y Ecografía cervical:

Estructura calcificada en hueso supraclavicular derecho, de disposición perpendicular a la clavícula, con imagen distal sugestiva de pseudoarticulación.  
Conclusión: costilla cervical derecha con pseudoarticulación con la primera costilla.



# Conclusiones

La **costilla cervical** es un hallazgo poco frecuente, pero a considerar por el pediatra de urgencias dentro del diagnóstico diferencial. Dada la ansiedad que genera una tumoración de dichas características, la localización y la necesidad de establecer un diagnóstico lo antes posible, es necesario enfocar al paciente en urgencias y solicitar las pruebas complementarias necesarias para establecer el diagnóstico y aliviar la ansiedad familiar que causan este tipo de lesiones.

