

XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA
REUNIÓN
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021



Minimizar
mejorar
Avanzar

XXV REUNIÓN SEUP

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021

PRIMERA
REUNIÓN
VIRTUAL

PÓSTER SIN DEFENSA

Minimizar
mejorar
Avanzar

EL DESPISTE DE LA PICADURA

Lorén Martín, J.P ; Díaz-Delgado Menéndez, B; Miranda Alcalde, B;
Gutiérrez Vélez, Rebeca; Linares Lejarraga, L; López-Ibor Aliño, B

Hospital HM Montepíncipe, Boadilla del Monte; Hospital HM Puerta del Sur, Móstoles

RESUMEN DEL CASO

HISTORIA CLÍNICA:

Varón de 7 años, sin antecedentes de interés.

1ª CONSULTA EN URGENCIAS:

- HA: dolor en pierna derecha a la salida del colegio. La madre objetiva picadura a dicho nivel.
- EF: constantes vitales normales. Palidez cutánea pero no de mucosas. Tumefacción a nivel peroneo de pierna derecha coincidiendo con una picadura de insecto.
- PPCC: PCR 23 mg/L, LDH 800.
- Dx: celulitis
- Plan: ingreso para tratamiento intravenoso con amoxicilina clavulánico
- Evolución: tras 3 días de antibiótico intravenoso, alta a domicilio con antibiótico oral.

EVOLUCIÓN

1 mes después... CONSULTA DE PEDIATRÍA DE ATENCIÓN :

Consulta por el mismo motivo, el pediatra considera que el estado de la pierna es normal en dicho contexto clínico.

1 semana más tarde... 2ª CONSULTA EN URGENCIAS:

- HA: persistencia de la tumoración junto con dolor y cojera.
- EF: Constantes vitales normales. Tumefacción de miembro inferior derecho de consistencia dura, piel brillante y tersa, sin dolor a la palpación.
- PPCC:
 - Analítica de sangre: PCR 38 mg/L.
 - Rx de pierna derecha: reacción perióstica generalizada en peroné derecho con gran compromiso de partes blandas.
 - Ecografía: confirma tumor óseo con extensión a partes blandas y gran vascularización.
- Dx: **TUMOR DE EWING DE PERONÉ DERECHO LOCALIZADO**



CONCLUSIONES

- Los dolores osteomusculares son un motivo de consulta frecuente en pediatría y, aunque la causa más frecuente son los traumatismos banales, tras ellos pueden esconderse patologías importantes.
- Es importantes asegurar un seguimiento tras un alta hospitalaria para cerciorarse de que el cuadro queda resuelto por completo.