

XXVI REUNIÓN **PAMPLONA** | 16 AL 18 DE JUNIO DE 2022

**SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
URGENCIAS DE PEDIATRÍA**



**SUPERVIVENCIA SIN EVIDENCIA:
Aprendiendo para el futuro**

PÓSTER CON DEFENSA

**"READMISIONES CON INGRESO" DURANTE
LA PANDEMIA. ¿QUÉ HA CAMBIADO?**

Autores: Gómez Puche, Francisco; Pérez Pérez, María del Carmen; Moralo García, Sara; Martínez Álvarez, Ana; Del Toro Saravia, Carlos; Pérez Cánovas, Carlos

Centros de trabajo: HU Virgen de la Arrixaca (Murcia)

"READMISIONES CON INGRESO" DURANTE LA PANDEMIA. ¿QUÉ HA CAMBIADO?

INTRODUCCIÓN: El indicador de calidad (IC) "Readmisiones con ingreso" permite detectar pacientes que ingresan y en los que la atención no ha sido adecuada en una consulta inicial. La pandemia por SARS-CoV-2 ha supuesto una gran variación en la asistencia sanitaria habitual en los SUP, que se puede ver reflejada en la evaluación del IC.


OBJETIVOS: Comprobar si hay diferencias en una muestra obtenida en prepandemia y otra en pandemia. en la tasa del IC "Readmisiones con ingreso" y comparar ambas muestras.

METODOLOGÍA: Revisión retrospectiva en los meses de junio y diciembre de 2019 (prepandemia) y 2020 (pandemia) de las readmisiones con ingreso tras consulta en las 72 horas previas.

RESULTADOS

TASA READMISIONES CON INGRESO

Año	Mes	Tasa (%)
2019	Junio	11,4%
	Diciembre	18,1%
2020	Junio	9,2%
	Diciembre	10,8%



		PRE-COVID (2019)	COVID (2020)	SIGNIFICACIÓN ESTADÍSTICA
Sexo	Varón	73 (52,9%)	10 (45,5%)	n.s
	Mujer	65 (47,1%)	12 (54,5%)	
Mediana edad		19 meses (4 – 44,7)	28 meses (15,5 – 85,5)	p < 0,05
Edad	< 12 meses	54 (39,1%)	5 (22,7%)	n.s
	≥ 12 meses	84 (60,9%)	17 (77,3%)	
Día CI	Laborable	76 (55,1%)	14 (63,6%)	n.s
	Festivo	62 (44,9%)	8 (36,4%)	
Triaje CI	1 – 2 – 3	114 (82,6%)	16 (72,7%)	n.s
	4 – 5	24 (17,4%)	6 (27,3%)	
Triaje RA	1 – 2 – 3	129 (93,5%)	17 (77,3%)	p < 0,05
	4 – 5	9 (6,5%)	5 (22,7%)	
MC	Respiratorio	64 (72,7%)	3 (21,4%)	p < 0,05
	Fiebre	24 (27,3%)	11 (78,6%)	
Manejo CI	Adecuado	134 (97,1%)	20 (90,9%)	n.s
	No adecuado	4 (2,9%)	2 (9,1%)	

CONCLUSIONES: En pandemia hubo una reducción significativa en la proporción de ingresos, enfermaron menos lactantes, el motivo de ingreso más frecuente fue la fiebre y aumentaron los niveles de triaje no graves. La tasa del indicador se cumplió sobradamente por la disminución de los procesos respiratorios.