SARS CoV2 elevando el ST

Gómez Gérez C., Hortigüela Aparicio M., Cabrerizo Ortiz M., Pérez-Moneo Agapito M., Solana Gracia R., Pérez-Moneo Agapito B
Servicio de Pediatría, Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid

Introducción

El 11 de marzo de 2020 la OMS cataloga la infección de **SARS CoV2** como pandemia.

No se conoce el porcentaje total de infecciones SARS-CoV-2 en niños, pues hasta un 50 % pueden ser asintomáticos. En España, en población pediátrica:

- ♥ Tasa de hospitalizaciones: 4-6/1000 infectados
- ♥ Tasa de ingresos en unidad de cuidados intensivos 3-4/10 000
- ♥ Tasa de letalidad de 2-4/100 000.

A pesar de que la mayoría de los casos de infección por SARS-CoV-2 en pediatría tiene un curso leve:

desde **mayo de 2020** se han registrado casos de **síndrome sistémico inflamatorio (PIMS)**, de expresividad variable, así como casos de **miocarditis y shock cardiogénico** asociados a la COVID-19.

Caso clínico

Anamnesis

Adolescente de 14 años traída a urgencias **por disnea y dolor centro-torácico opresivo**. No síncope ni palpitaciones.

- Dolor aumenta con el decúbito supino y la inspiración profunda.
- Dolor disminuye al inclinar el tórax hacia delante.

Antecedentes inmediatos

Valorada ese día en urgencias por cuadro de 24 horas de evolución consistente en **odinofagia y fiebre** (máximo 39'5°C), con diagnóstico de faringoamigdalitis (test rápido de SGA negativo, 5 criterios de Centor) con inicio de antibioterapia.

Antecedente de infección por SARS-CoV-2 el mes previo.

Exploración física

Triángulo de evaluación pediátrica estable.

Hemodinámicamente estable

Exploración física por aparatos **normal**, con **auscultación cardíaca rítmica sin soplos ni roce pericárdico**, auscultación pulmonar normal.

Destaca exclusivamente el **aumento de dolor con el decúbito**.

Pruebas complementarias

1. Electrocardiograma:

- ❖ Ritmo sinusal
- ❖ Elevación cóncava del ST
 - Precordiales
 - Cara inferior
 - Máxima 2.5mm

2. Radiografía de tórax: anodina.

3. Analítica: **proBNP 288pg/mL**, **TroponinaI 12195pg/mL**, CPK 887U/L, INR 1'4.3, fibrinógeno >500mg/dL y PCR 136'8mg/L

4. Serologías víricas: Negativas.

5. PCR SARS-CoV2: Positiva.

6. Ecocardiograma: adecuada función biventricular, ausencia de derrama pericárdico.

La paciente es diagnosticada de **miopericarditis en relación a SARS CoV2** y se traslada a hospital de referencia con unidad de cuidados intensivos para monitorización y tratamiento

Comentarios

La **miocarditis** es un proceso inflamatorio del miocardio, que de forma más frecuente aparece desencadenado por una **causa** infecciosa, fundamentalmente **viral**, siendo uno de los virus identificados el **SARS-CoV-2**.

El espectro clínico de la miocarditis es variable
pacientes con síntomas leves ← → formas graves fulminantes con shock cardiogénico.

Ante la situación actual de la pandemia, debemos tener en cuenta este posible diagnóstico ante pacientes pediátricos con dolor torácico y clínica sugestiva.