XXVI REUNIÓN **PAMPLONA** | 16 AL 18 DE JUNIO DE 2022

**SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
URGENCIAS DE PEDIATRÍA**

**SUPERVIVENCIA SIN EVIDENCIA:
Aprendiendo para el futuro**

COMUNICACIÓN ORAL LARGA

**Manejo más conservador de fracturas en
rodete en Urgencias de Pediatría**

Autores: Carmona A; Daghoum E; Lopez E; San Emeterio RM; Mojas A; Fernandez A.

Hospital Universitario Cruces

Los autores declaran que **no existe ningún conflicto de interés** respecto a este estudio

INTRODUCCIÓN

Fracturas en rodete

Estables
El desplazamiento es infrecuente
Pronóstico excelente

	Urgencias		Control posterior	
	Inmovilización	Tiempo	Rx control	Médico
Qué hacemos	Yeso	4 semanas	Sí	Trauma
Evidencia	Férula	2-3 semanas	No	Pediatra

INTRODUCCIÓN

Manejo más conservador conlleva:

- Menos consultas
- Menos molestias
- Mejor rendimiento escolar
- Menor radiación

INTRODUCCIÓN

- ✓ Manejo más conservador utilizado en otros países
- ✓ No hay estudios en nuestro entorno

OBJETIVO

Analizar la **factibilidad, seguridad e idoneidad** del manejo **más conservador** de las fracturas en rodete de extremidad superior por parte de **pediatras** de un servicio de urgencias.

MÉTODO

- ✓ 55,000 consultas urgencias al año en HUC
- ✓ Atención integral al paciente <14 años
- ✓ Atención desde su llegada al paciente traumatológico desde 2003

MÉTODO

MÉTODO

Equipo multidisciplinar

- Pediatría (adjuntos + MIR)
- Enfermería pediatría
- Traumatología

MÉTODO

Cambio en protocolo manejo FR:

- Yeso → **Férula**
- Consulta trauma: 7-10 días → **15 días**
- Inmovilización ≤ **3 semanas**

MÉTODO

- Registro **prospectivo**
- Duración: **8 meses**
- Revisión HC y evolutivos Traumatología hasta retirada inmovilización
- Manejo recibido pediatra de Urgencias (**factibilidad**)

MÉTODO: Variables de control (seguridad e idoneidad)

- Cambio de diagnóstico por Traumatología
- Cambio de inmovilización
- Duración inmovilización
- Reconsulta Urgencias
- Necesidad intervención quirúrgica posterior
- Secuelas de fractura

RESULTADOS

28.284 niños atendidos en Urgencias HUC (8 meses)

3.592 Traumatismo periférico (12.7%)

219 Fractura rodete de ES (pediatra)

RESULTADOS

219
Dx fractura rodete
por pediatra

SEXO

EDAD (años)

> 50%
> 8 años

RESULTADOS: Factibilidad

RESULTADOS: Variables de control (seguridad e idoneidad)

Consulta Traumatología

Cambio diagnóstico

Cambio inmovilización

RESULTADOS: Factibilidad

Tiempo inmovilización

Reconsulta urgencias (3.2%)

RESULTADOS

TODOS LOS PACIENTES:

- ✓ Buena evolución
- ✓ No necesitaron cirugía
- ✓ No secuelas

CONCLUSIONES

El manejo de las fracturas en rodete con férula antebraquial por parte de los pediatras de urgencias es **factible, seguro e idóneo**

CONCLUSIONES

Debe considerarse la participación de los médicos que realizan el seguimiento de los pacientes para **adecuar el tiempo de inmovilización** de la fractura

¿QUÉ SABÍAMOS?

- Fracturas en rodete son estables y desplazamiento infrecuente
- En otros entornos se ha demostrado seguridad de manejo más conservador

¿QUÉ APORTAMOS?

- Comprobación de factibilidad, seguridad e idoneidad del manejo más conservador por pediatras de Urgencias en nuestro entorno

Colocación de yeso en Urgencias

Colocación yeso en Urgencias		Diagnóstico en Urgencias	Cambio inmovilización
1		Tallo verde	
2	+ Reducción cerrada	Tallo verde	
1		Epifisiolisis	
7		Rodete	1 Férula
			6 mantienen Yeso

Cambio de diagnóstico

Nº	Dx	Cambio de inmovilización		¿Cuándo?
7	Epifisiolisis	3	Yeso	1 Dx
				2 Seguimiento
		4	Férula	
11	Tallo verde	4	Yeso	3 Dx
				1 Seguimiento
		7	Férula	

Cambio de inmovilización en seguimiento

Nº	Dx	Inmovilización en seguimiento Trauma
1	Rodete	Férula
7	Rodete	Yeso
2	Epifisiolisis	Yeso
1	Tallo verde	Yeso

Inmovilización prolongada

Semanas inmovilización	Rodete	Epifisiolisis	Tallo verde
4	78	3	5
5	19	1	2
6	3		
8	1		

Reconsultas

7 RODETES

Motivo reconsulta	Reconsulta	EF	Manejo reconsulta
Dolor por férula	2 días	Eritema	Recambio férula
Dolor	3 días	Normal	Recambio férula
Dolor al retirar férula	19 días (3d tras retirar férula)	Normal	Colocan Férula
Férula rota	3 días	Normal	Recambio férula
Férula rota	8 días	Normal	Recambio férula
Rotura yeso	17 días	Normal	Recambio yeso
Salida yeso	24 días	Normal	Recambio yeso

Hueso fracturado

Nº	Hueso afecto
179	Radio
19	Cúbito + radio
2	Cúbito
2	Radio bilateral