XXVI REUNIÓN PAMPLONA | 16 AL 18 DE JUNIO DE 2022 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE URGENCIAS DE PEDIATRÍA



COMUNICACIÓN CORTA

Valoración de la calidad asistencial en casos de bronquiolitis aguda en nuestro servicio de urgencias pediátricas a través del análisis del cumplimiento de indicadores de calidad definidos por la SEUP

de Pablo Fernández, Lucía; Barrios Tascón, Ana; Pacheco Cumani, Mónica; Plazaola Cortázar, Ane; Yebra Yebra, Julia; Martínez López, Andrea

Departamento de Pediatría del Hospital Universitario Infanta Sofía, Madrid

INTRODUCCIÓN



OBJETIVOS

Evaluar el protocolo asistencial de la bronquiolitis aguda en el Servicio de Urgencias pediátricas en nuestro centro, valorando el grado de cumplimiento de los indicadores de calidad definidos por la SEUP en 2018.









METODOLOGÍA Y RESULTADOS

Bronquiolitis = 942 pacientes

Muestra aleatoria (n) = 131 (13,9%)

Edad y sexo FR y SpO2 Score gravedad Nivel triaje

Indicadores de calidad SEUP 2018	Fórmula		Estándar
Valoración de la gravedad	N° de bronquiolitis con constatación de gravedad N° de bronquiolitis atendidas	x 100	> 90%
Tratamiento broncodilatador en bronquiolitis aguda	Nº de pacientes con bronquiolitis aguda tratados con broncodilatadores Nº de pacientes atendidos por bronquiolitis	- x 100	< 15%











METODOLOGÍA Y RESULTADOS

Mediana de edad 4,8 años













METODOLOGÍA Y RESULTADOS

Indicadores de calidad SEUP 2018	Resultado	Estándar
Valoración de la gravedad	93%	> 90%
Tratamiento broncodilatador (BD) en bronquiolitis aguda	16,07%	< 15%

Análisis por subgrupos

Edad	Uso de BD 56 % Moderac	
< 6 meses	6%	
> 6 meses	19.08%	
S Formeses	13.00/0	









CONCLUSIONES

- En nuestro centro se cumple el indicador de Valoración de la gravedad en bronquiolitis aguda.
- Se superó el estándar de cumplimiento del uso de broncodilatadores en el subgrupo de pacientes mayores de 6 meses y en más de la mitad de los casos con cuadros moderados-graves. Todos ellos precisaron posteriormente ingreso en UCI
- Las nuevas guías clínicas admiten la realización de prueba terapéutica en este grupo de pacientes, lo que llevaría a plantear la aplicación de este indicador únicamente en menores de 6 meses









i MUCHAS GRACIAS!













i MUCHAS GRACIAS!













i MUCHAS GRACIAS!









