XXVI | **REUNIÓN** PAMPLONA | 16 AL 18 DE JUNIO DE 2022

**SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
URGENCIAS DE PEDIATRÍA**

**SUPERVIVENCIA SIN EVIDENCIA:
Aprendiendo para el futuro**

COMUNICACIÓN CORTA

Tratamiento de la crisis asmática con dispositivo MDI y cámara espaciadora en urgencias pediátricas: ¿la pandemia nos ha ayudado a mejorar?

E. Domingo Lagman, E. May Llanas, S. Flores Villar, P. Donado-Mazarrón García, A. Moya Ortega, R. Garcia Puig

Servicio de Pediatría Hospital Universitari Mútua Terrasa

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

En el tratamiento de la crisis asmática, la administración de **broncodilatadores** mediante **dispositivos MDI y espaciadores** es, como mínimo, **tan eficaz** como su administración mediante **nebulizadores**.

La **pandemia** por SARS-CoV-2 ha requerido **minimizar las nebulizaciones** por el riesgo de propagación de aerosoles, permitiendo cambiar el manejo de estos pacientes.

Comparar el cumplimiento del **indicador de calidad** de la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas, **antes y durante la pandemia** por SARS-CoV-2, en relación al **tratamiento de la crisis asmática** de los niños atendidos por crisis asmáticas en nuestro centro.

MÉTODOS

- **Tipo de estudio:** observacional descriptivo retrospectivo
- **Centro:** Hospital Universitari Mútua Terrassa
- **Período:** enero-junio 2019 y octubre 2020-septiembre 2021
- **Criterios de inclusión:**
 - Pacientes 2-14 años con crisis asmáticas leves-moderadas sin hipoxemia que recibieron tratamiento en urgencias
- **Criterios de exclusión:**
 - Crisis asmáticas leves-moderadas con hipoxemia o graves
 - No registro en el informe de alta de: escala de gravedad, saturación de oxígeno o forma de administración del tratamiento en urgencias
- **Recogida de datos:** revisión de informes de alta de urgencias
- **Instrumentos:** escala de gravedad Wood-Downes-Ferrés, ICA SEUP nº 74 (revisión 2018)

MÉTODOS

74. Nombre del indicador: **TRATAMIENTO DE LA CRISIS ASMÁTICA CON DISPOSITIVO MDI Y CÁMARA ESPACIADORA**

Dimensión	Efectividad
Justificación	Durante la última década se han acumulado evidencias que confirman que la administración de broncodilatadores para el tratamiento de la crisis asmática (leve o moderada sin hipoxemia) mediante dispositivos MDI y espaciadores es, como mínimo, tan eficaz como su administración mediante nebulizadores Estas evidencias se han incorporado a los Consensos Internacionales sobre el tratamiento del asma
Fórmula	$\frac{\text{Nº de pacientes con crisis asmática leve o moderada sin hipoxemia tratados con MDI y espaciadores en Urgencias}}{\text{Nº de pacientes con crisis asmática leve o moderada sin hipoxemia que reciben tratamiento en Urgencias}} \times 100$
Explicación de términos	Inhalador de dosis controlada (su sigla en inglés es MDI): inhalador de dosis medida en cartucho presurizado con gas propelente Crisis asmática leve-moderada: síntomas respiratorios atribuidos a broncoespasmo sin tener en cuenta el posible desencadenante, la edad ni la existencia o no de episodios previos de intensidad leve o moderada según la escala utilizada Hipoxemia: $\text{SatO}_2 < 95\%$ con FiO_2 del 21%
Población	Pacientes asmáticos tratados en el Servicio de Urgencias
Tipo	Proceso
Fuente de datos	Documentación clínica
Estándar	> 95%
Comentarios	Se comprende que la utilización de dispositivos MDI + espaciador presenta problemas logísticos como: disponer de un nº importante de cámaras, desinfección de las mismas, educación sanitaria, etc.

RESULTADOS

PRE- PANDEMIA

- **Edad media:** 5,6 años
- **Sexo masculino:** 215 (57%)
- **Episodios previos crisis asmáticas:** 317 (84%)
- **Ingresos previos por crisis asmáticas:** 110 (29%)
- **Tratamiento de mantenimiento:** 136 (36%)
- **Valoración gravedad**
 - **Leves:** 147 (39%)
 - **Moderadas:** 205 (54%)
 - **Graves:** 27 (7%)

DURANTE PANDEMIA

- **Edad media:** 4,7 años
- **Sexo masculino:** 156 (56%)
- **Episodios previos crisis asmáticas:** 224 (81%)
- **Ingresos previos por crisis asmáticas:** 70 (25%)
- **Tratamiento de mantenimiento:** 74 (27%)
- **Valoración gravedad**
 - **Leves:** 116 (42%)
 - **Moderadas:** 110 (40%)
 - **Graves:** 51 (18%)

RESULTADOS

CONCLUSIONES

- En el contexto de la pandemia por SARS-CoV-2, en nuestro centro se observó un **mayor cumplimiento** del estándar de calidad de la SEUP en el **tratamiento de la crisis asmática**.
- **Refuerzo** de la idea de la **eficacia del dispositivo MDI y cámara de inhalación** en las crisis asmáticas leves-moderadas no hipoxémicas.
- **Objetivo: mantener el mismo manejo** de estos pacientes en urgencias (>95% estándar de calidad).

XXVI | **REUNIÓN** PAMPLONA | 16 AL 18 DE JUNIO DE 2022

**SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
URGENCIAS DE PEDIATRÍA**

**SUPERVIVENCIA SIN EVIDENCIA:
Aprendiendo para el futuro**

¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!