

**XXVI** | **REUNIÓN** PAMPLONA | 16 AL 18 DE JUNIO DE 2022

**SOCIEDAD ESPAÑOLA DE  
URGENCIAS DE PEDIATRÍA**



**SUPERVIVENCIA SIN EVIDENCIA:  
Aprendiendo para el futuro**

## COMUNICACIÓN CORTA

# ALTERACIÓN DE NIVEL CONCIENCIA COMO MOTIVO DE CONSULTA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS ATENDIDOS EN URGENCIAS DE PEDIATRÍA DE UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

**Figuroa S., Ruiz E., Sancho S., Díaz P., Peñalba AC., Guerra JL.**

*Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Santander)*

# ALTERACIÓN DEL NIVEL DE CONCIENCIA

Motivo de consulta que puede precisar intervención inmediata, así como un reto diagnóstico para los pediatras por el espectro de patologías tan amplio que puede englobar.

## OBJETIVOS.


1. Definir las características de los pacientes que consultan por alteración de conciencia en urgencias de pediatría de un hospital de tercer nivel.
2. Definir la necesidad de ingreso de los pacientes que consultan por alteración del nivel de conciencia en un servicio de urgencias de pediatría de un hospital de tercer nivel.

**METODOLOGÍA:** revisión de historias clínicas de pacientes que consultaban en urgencias por alteración de la conciencia, objetivada por los cuidadores en domicilio, en sus diferentes grados. 2 primeras semanas de cada mes del año 2021.

# RESULTADOS (I)


**n= 100 pacientes que consultaron en urgencias por alteración de nivel de conciencia.**

## Condición neurológica previa



De los que sí, el 58,1% eran epilépticos conocidos. La segunda patología más frecuente, retraso del desarrollo psicomotor.


## Diagnósticos



- Crisis convulsivas: 44%
- Episodios de pérdida de conciencia de difícil catalogación (episodios paroxísticos): 22%
- Síncopes: 18%
- Intoxicaciones etílicas: 8%
- Otros: 8%

## RESULTADOS (II)

¿Episodio previo de pérdida de conciencia?



■ Sí: 40% ■ NO: 60%

Tras la valoración por pediatra de urgencias, se confirmó una alteración de nivel de conciencia en **6 pacientes**:

3 intoxicaciones (2 étlicas y 1 por cannabis)

1 patología vascular

1 tumoral

1 inespecífica

# RESULTADOS (III)

## NECESIDAD DE INGRESO


Del total, ingresaron el 50% (3% UCIP)

Ingresaron el **50%** de los pacientes del grupo en el que se confirmó alteración de la conciencia (3 de 6).

En los pacientes sin alteración a su llegada a urgencias, (94 pacientes), ingresaron el **52%**.

**SEGUIMIENTO POSTERIOR:** 48,1%  
36,27% Neuropediatría  
11,8% otras especialidades

## Necesidad de ingreso



**TIEMPO MEDIO DE ESTANCIA EN URGENCIAS:** 124 vs.150 minutos ( $p < 0,05$ )

# CONCLUSIONES (I)

En nuestra muestra, más de la mitad de los pacientes que consultaron por alteración de la conciencia presentaban alguna **patología neurológica crónica**, estando estas principalmente comprendidas por epilepsia de base o retraso psicomotor.

Los pacientes que acuden a urgencias por alteración del nivel de conciencia, en la mayoría de los casos presentan patología neurológica aguda, siendo las **convulsiones** el principal grupo. Además, el 40% de ellos ya había sufrido un episodio de pérdida de conciencia previo.

El tiempo de observación de los pacientes con alteración del nivel de conciencia a su llegada fue mayor que en los que no la presentaban.

## CONCLUSIONES (II)

La alteración de la conciencia constituye una patología que implica ingreso hospitalario en un porcentaje elevado de casos, **no solo en el grupo de pacientes que presentaron alteración de nivel de conciencia en su valoración en urgencias**, sino en pacientes con alteración de conciencia referida por los cuidadores.

Sin embargo, **el grupo de niños en el que se objetiva una alteración de la conciencia en urgencias no presenta mayor porcentaje de ingresos que en los casos no objetivados.**

Casi la mitad de estos pacientes necesitará un seguimiento posterior por parte de algún especialista.

# ¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!



XXVI REUNIÓN SEUP



SEUP  
SOCIETY OF ENVIRONMENTAL PSYCHOLOGY  
PAMPLONA  
16 AL 18 DE JUNIO DE 2022