

XXVI REUNIÓN **PAMPLONA** | 16 AL 18 DE JUNIO DE 2022

**SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
URGENCIAS DE PEDIATRÍA**



**SUPERVIVENCIA SIN EVIDENCIA:
Aprendiendo para el futuro**

COMUNICACIÓN CORTA

**BRONQUIOLITIS AGUDA EN URGENCIAS DE PEDIATRÍA.
¿SE MANTIENEN LOS RESULTADOS CON EL TIEMPO?**

Bedialauneta Somoza, O; Diez Martin, E; Olaciregui Echenique, I; Cámara Otegui, A; Muñoz Bernal, JA; Calvo Monge, C

Hospital Universitario Donostia, Gipuzkoa.


INTRODUCCIÓN

Gran demanda
asistencial y
variabilidad en el
manejo
terapéutico



**NUEVA RUTA
ASISTENCIAL** de la
bronquiolitis



- 
1. **Unificar y mejorar** manejo.
 2. **Disminuir** el uso de fármacos innecesarios

OBJETIVO



Comparar el manejo de la bronquiolitis aguda al inicio y dos años después de la implantación de la nueva estrategia asistencial en Urgencias de Pediatría de un hospital terciario.

MÉTODOS

ESTUDIO: observacional, descriptivo y retrospectivo.

POBLACIÓN:

- Diagnosticados de **bronquiolitis aguda**.
- En **urgencias** de pediatría.
- Del 15 de octubre y el 15 de diciembre del **2021**.

VARIABLES ANALIZADAS: gravedad, pruebas complementarias, tratamiento recibido, número de reconsultas e ingresos.

VS

A COMPARAR:



- Diagnosticados de **bronquiolitis aguda**.
- En **urgencias** de pediatría.
- Del 15 de octubre y el 15 de diciembre del **2019**.



χ^2 y test exacto de Fisher

RESULTADOS

 n = 593

 2019: 296  2021: 297

Variables	2019	2021	P*
Gravedad			
<i>Leve</i>	187/296 (63,2%)	210/297 (70,7%)	NS
<i>Moderada</i>	95/296 (32,1%)	82/297 (27,6%)	NS
<i>Grave</i>	14/296 (4,7%)	5/297 (1,7%)	0,03
Radiografía de tórax	24/296 (8,1%)	20/297 (6,7%)	NS
Salbutamol	7/296 (2,4%)	33/297 (11,1%)	p<0,0001
Adrenalina	40/296 (13,5%)	0/297 (0%)	p<0,0001
Corticoterapia	4/296 (1,35%)	3/297 (1%)	NS
Antibioterapia	9/296 (3,04%)	4/297 (1,3%)	NS
Reconsultas	45/296 (15,2%)	26/297 (8,8%)	0,015
Ingresos	97/296 (32,8%)	81/297 (27,3%)	NS

CONCLUSIONES

- **Aumento** del uso de **salbutamol** de manera significativa.
- **Disminución** del uso de **adrenalina**.
- **Disminución** de las **reconsultas** con un número de ingresos similar.