

**XXVI** | **REUNIÓN** PAMPLONA | 16 AL 18 DE JUNIO DE 2022

**SOCIEDAD ESPAÑOLA DE  
URGENCIAS DE PEDIATRÍA**



**SUPERVIVENCIA SIN EVIDENCIA:  
Aprendiendo para el futuro**

**COMUNICACIÓN CORTA**

**Corticoides en las laringitis agudas,  
¿Uso o abuso?**

**Crespo Gómez, Patricia ; Catarineu de la Fuente, Nora; Muñoz Bernal, José Ángel; Olaciregui Echenique, Izaskun; Cámara Otegui, Amaia; Calvo Monge, Cristina**

*Hospital Universitario Donostia. Donostia, Gipuzkoa.*

# Introducción y objetivos




- Laringitis aguda: causa de obstrucción de la vía aérea superior más frecuente en la infancia (3-5% de los niños)



- Corticoides: principal pilar del tratamiento.

# Introducción y objetivos

● Rango de dosis amplio



- Analizar las **dosis empleadas** en función la gravedad, determinar si en las LA **leves** han sido superiores a las recomendadas
- Relación **dosis y reconsultas**
- Proponer **nueva pauta de actuación** y evitar sobreuso de corticoterapia

# Material y métodos



# Material y métodos

## Clasificación gravedad - Westley score

	0	1	2	3	4	5
Retracciones	No	Leve	Moderado	Grave		
Estridor	No	Con la agitación	En reposo			
Cianosis	No	No	No	No	Con la agitación	En reposo
Nivel de consciencia	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Disminución
Ventilación	Normal	Leve hipofonesis	Hipofonesis marcada			



## Clasificación dosis utilizadas

	Dosis GCs
Bajas	<0,2 mg/kg
Moderadas	0,2-0,499 mg/kg
Altas	≥0,5 mg/kg



● Leve: 0-2

● Moderada: 3-7

● Grave: ≥8

# XXVI REUNIÓN SEUP




SEUP  
Sociedad Española de Pediatría  
PAMPLONA  
16 AL 18 DE JUNIO DE 2022

# Resultados


- n= 463
- Mediana de edad: 3 años
- 62% varones




*Gravedad*



*Tratamiento empleado*




*Dosis GC*




# Resultados

## Dosis de GC empleadas según la gravedad



# Resultados

## Reconsultas (total y según gravedad)



- Reconsultan 3,5 veces más las moderadas ( $p < 0,05$ )
- La **dosis** de corticoide, teniendo en cuenta la **gravedad**, **no** presentó efecto estadísticamente **significativo** en la frecuencia de reconsultas ( $p = 0,19$ )

# Conclusiones

- La mayoría de las LA **leves** han sido tratadas con **dosis** de dexametasona **superiores** a las recomendadas.
- El **tratamiento sintomático** y las **dosis bajas** de dexametasona **no** muestran **peor evolución**; pauta de tratamiento de las **LA leves**.



# XXVI REUNIÓN SEUP

