

XXVI REUNIÓN **PAMPLONA** | 16 AL 18 DE JUNIO DE 2022

**SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
URGENCIAS DE PEDIATRÍA**



**SUPERVIVENCIA SIN EVIDENCIA:
Aprendiendo para el futuro**

PÓSTER CON DEFENSA

**Signos y síntomas iniciales de Guillain-Barré,
reconociéndolo en las urgencias pediátricas**

Autores: Gutiérrez Rodríguez A, Martín Latorre MM, Machí Castañer I, Martínez Espinosa G, Pulido Esteban R, Aguilera López P.

Hospital Materno Infantil Torrecárdenas, Almería

Introducción

- 1º causa de **parálisis flácida aguda** en niños en países desarrollados (*incidencia: 1-2 casos por cada 100.000 habitantes*)
- **Debilidad muscular progresiva simétrica ascendente con hipo o arreflexia osteotendinosa**, aunque en niños son frecuentes las formas atípicas

Objetivo

Conocer los **motivos de consulta**, la **clínica** y la **exploración** de los pacientes con Guillain-Barré en urgencias pediátricas.

Resultados


14 pacientes

Epidemiología y antecedentes

Edad media	4,7 años
Mujeres	42,9%
Patología de base	35,7%
Vacunación previa	7,1%
Infección previa	85,7%
Evolución al consultar	7,29 días


Metodología

Estudio **descriptivo**: Casos de síndrome de Guillain-Barré que ingresaron de un hospital de tercer nivel (1/01/2012 hasta 31/01/2022)



Motivos de consulta y clínica

■ Urgencias ■ Ingreso



Conclusiones

El Síndrome de Guillain-Barré es **poco frecuente** en Pediatría, sin embargo, es importante su **diagnóstico precoz**.

Importancia de la clínica y exploración física: afectación motora + alteración de reflejos