

¿CÓMO ENFRENTARNOS A LAS ÚLCERAS GENITALES?

Martínez López, Elisa¹ ; Martín Uceda, Sara¹; Martín Isabel, Beatriz¹; Rodríguez Lozano, Andrea¹; Aquino Oliva, Elena²; Crespo Rupérez, Esther².

¹MIR Pediatría; ²FEA Urgencias pediátricas. Hospital Universitario de Toledo

CASO CLÍNICO

Niña de 9 años que acude con úlceras genitales, fiebre de hasta 40°C, odinofagia y astenia de cuatro días de evolución.

Exploración física: dos úlceras de 1-2 cm, en espejo en horquilla posterior de labios menores, con base de fibrina, halo eritematosos y edema perilesional.

Pruebas complementarias: leucocitosis con neutrofilia y elevación de reactantes de fase aguda. Serologías y cultivos negativos.

Tratamiento: analgesia pautada, curas locales con suero salino fisiológico y corticoides tópicos.

Evolución: desaparición completa del cuadro a las 2 semanas sin cicatriz residual.



ÚLCERAS DE LIPSCHÜTZ

- Etiología desconocida.
- Entidad infradiagnosticada, niñas y adolescentes sin relaciones sexuales ni datos de abuso sexual.
- Diagnostico de exclusión, solicitar pruebas complementarias.
- Tratamiento sintomático, antibiótico si variable gangrenosa.

COMENTARIOS