XXVI REUNIÓN SOCIEDAD ESPAÑOLA DE URGENCIAS DE PEDIATRÍA
PAMPLONA | 16 AL 18 DE JUNIO DE 2022
SUPERVIVENCIA SIN EVIDENCIA:
Aprendiendo para el futuro

COMUNICACIÓN CORTA

Impacto del confinamiento en las intoxicaciones pediátricas

Prigent Díaz A, García Oller A, Maeso Méndez S, Gainzarain Serna A, Etxebarria Aurrekoetxea M, Torrús Carmona S.

Servicio de Pediatría, Hospital Universitario Araba – Txagorritxu, Vitoria-Gasteiz.

Introducción

- Las consultas por intoxicación suponen el **0,3% de las consultas atendidas** en los Servicios de Urgencias Pediátricas españoles.

- El estado de alarma decretado por la **pandemia por SARS-CoV-2** mantuvo a la población infantil **confinada en su domicilio**, pudiendo influir en las características de las intoxicaciones ocurridas en ese periodo de tiempo.

Objetivo

Comparar la **incidencia** y **características epidemiológicas** de las intoxicaciones atendidas en nuestro centro durante el **estado de alarma**, comparándolas con las del mismo periodo en **2018**, **2019** y **2021**.

Metodología

Estudio descriptivo retrospectivo

0 a 14 años

Consulta por intoxicación

Estado de alarma (15/03-21/06/20)
y mismo periodo de 2018, 2019 y 2021

Resultados

***Estado de alarma** 15/03/20-21/06/20:*
2840 pacientes atendidos → 21 consultaron por intoxicación (0,74%)





Hombre Mujer



Lactante (≤1 año) Preescolar (2-5 años)
Escolar (6-11 años) Preadolescente (≥12 años)



Ingesta/contacto no intencionado
Suicida
Error de dosificación



Fármacos Productos del hogar
Mínimamente tóxicos Otros



Síntomas Sí Síntomas No



Ingreso Sí Ingreso No

Resultados

Consultas en el SUP para el mismo periodo (15/03-21/06)





- **Descenso de las visitas totales en urgencias** (casi del 65%), manteniéndose constantes las intoxicaciones, dando lugar a una mayor proporción de éstas

- Cambio de tendencia respecto al sexo, con un **incremento del masculino**

- Porcentaje más alto de pacientes en **edad preescolar**



Resultados





- Mayor proporción de **pacientes sintomáticos** y de **necesidad de descontaminación intestinal**
- Incremento de intoxicaciones por **ingesta de fármacos**
- **Ingestas no intencionadas** siguen siendo las más frecuentes





Conclusiones

- **Incremento porcentual** de las intoxicaciones pediátricas.
- Aumento de las **intoxicaciones no intencionadas por fármacos**.
- Aumento de **pacientes sintomáticos**.
- Todas ellas ocurren **en el domicilio**.