

**XXVI** | **REUNIÓN** PAMPLONA | 16 AL 18 DE JUNIO DE 2022

**SOCIEDAD ESPAÑOLA DE  
URGENCIAS DE PEDIATRÍA**



**SUPERVIVENCIA SIN EVIDENCIA:  
Aprendiendo para el futuro**

COMUNICACIÓN ORAL

# Riesgo autolítico ¿Ha afectado la pandemia a nuestros pacientes?

Pamplona, 18 de junio de 2022

**Del Arco Guzmán, Natalia; González Vázquez Elisa; Díaz Martos, Julio;  
García Requena, Esther; Oliva Rodríguez-Pastor, Silvia.**

*Unidad de Cuidados Críticos y Urgencias del Hospital Materno Infantil de Málaga.*




Hospital Regional  
Universitario  
de Málaga

# INTRODUCCIÓN



- El suicidio representa la **segunda causa de muerte** en <19 años.
- **Aumento** de consultas por intentos o gestos autolíticos en los servicios de Urgencias pediátricas.



INTENTO DE  
AUTOLISIS

# OBJETIVO

Analizar y comparar las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes <14 años que acudieron al servicio de Urgencias de un hospital de tercer nivel por intento de autolisis en los períodos 2018-2019 y 2020-2021, así como evaluar sus factores de riesgo.

# MATERIAL Y MÉTODOS

Descriptivo, retrospectivo




Pacientes que acudieron a Urgencias con motivo de consulta “intento de autolisis” (enero de 2018 y diciembre de 2021).

2018-2019

2020-2021

Análisis y comparación de variables clínico-epidemiológicas y psicosociales de la muestra.



# RESULTADOS

N= 101

	2018-2019	2020-2021	
INTENTO AUTOLISIS	35	66	101
OTRO MOTIVO	173003	122457	295460
TOTAL URGENCIAS	173038	122523	295561

$p < 0,001$

	2018-2019	2020-2021	P
SEXO (MUJER)	28 (80%)	53 (80.3%)	0.971
EDAD	12.6 (12.33-12.93)	12.6 (12.29-12.83)	0.750
AUTOLESIONES	20 (57.1%)	26 (39.4%)	0.736
TRATAMIENTO DOMICILIARIO	11 (31.4%) BDZ+ISRS (4)	24 (36.4%) ISRS (8)	0.620
TRATAMIENTO URGENCIAS	2 (5.7%) BZD+APS	9 (13.6%) BZD (4) APS (4)	0.224
INGRESO	6 (14.1%)	7 (10.6%)	0.351

Tabla 1. Características epidemiológicas en período 2018-2019 y 2020-2021.




Imagen 1. Método


**No existen diferencias estadísticamente significativas en variables clínico-epidemiológicas en ambos períodos**

	2018-2019	2020-2021	p
<b>DISTOCIA FAMILIAR</b>	11 (31.4%)	<b>43 (65.2%)</b>	<b>0.010*</b>
<b>AVE*</b>	9 (25.7%)	<b>37 (56.1%)</b>	<b>0.040*</b>
DIFICULTAD ESCOLAR	18 (51.4%)	29 (43.9%)	0.473
<b>ADOPCIÓN</b>	<b>10 (33.3%)</b>	9 (13.6%)	<b>0.025*</b>
INMIGRACIÓN	15 (42.9%)	16 (24.2%)	0.054
<b>IMPULSIVIDAD</b>	3 (8.6%)	<b>17 (25.8%)</b>	<b>0.039*</b>
RIGIDEZ	4 (11.4%)	9 (13.6%)	0.753

Tabla 2. Factores implicados en los intentos de autolisis.

AVE: Acontecimiento vital estresante.

# CONCLUSIONES



Tal como se observa en la bibliografía, han aumentado los intentos de autolisis en el período 2020-2021.

Las características epidemiológicas son similares en ambos períodos.

**Aumento de factores de riesgo** de intento de autolisis que podrían estar en relación con la pandemia como son la **distocia familiar**, **acontecimiento vital estresante** y la **impulsividad**.

¡GRACIAS!



XXVI REUNIÓN SEUP





XXVI REUNIÓN SEUP



SEUP  
Sociedad Española de Urbanismo Planiplero  
PAMPLONA  
14 AL 18 DE JUNIO DE 2022