

**XXVI** | **REUNIÓN** PAMPLONA | 16 AL 18 DE JUNIO DE 2022

**SOCIEDAD ESPAÑOLA DE  
URGENCIAS DE PEDIATRÍA**



**SUPERVIVENCIA SIN EVIDENCIA:  
Aprendiendo para el futuro**

Comunicación corta

# Comparación de intentos autolíticos prepandemia y durante la pandemia

Morales Albertos, Laura ; Carranza Ferrer, Jorge; Izquierdo Herrero, Elsa; Sendino González, Jorge; Castro Rey, Margarita del Carmen;  
Ortega Vicente, Elena

*Hospital Clínico Universitario de Valladolid*

# GUIÓN

- Introducción
- Objetivo
- Métodos
- Resultados
- Conclusiones



# INTRODUCCIÓN

- Preocupación por aumento de problemas de salud mental
- Repercusión de la pandemia y el confinamiento
- Grupo de edad vulnerable



# OBJETIVO

Evaluar si hubo un aumento significativo en la frecuencia de comportamientos relacionados con el suicidio durante la pandemia COVID 19 vs años previos



# MÉTODOS


- Cohortes retrospectivo
- <14 años atendidos en Urgencias
- Ideación, tentativa o intento de suicidio
- Período 2018-2022
- Variables clínicas y sociodemográficas -> Revisión Historias Clínicas Electrónicas
- SPSS vs 25

# RESULTADOS

- Se analizaron las historias clínicas de 30 consultas en urgencias de ideación o intento autolítico
- La mediana de edad fue 12 años


# RESULTADOS

Sexo global



$P < 0,05$

# RESULTADOS



■ Urgencias ■ Intentos autolíticos

XXVI REUNIÓN SEUP




SEUP  
Sociedad Española de  
Urología y Pediatría  
PAMPLONA  
16 AL 18 DE JUNIO DE 2022




# RESULTADOS

## Patología psiquiátrica previa



# RESULTADOS

## Tentativas previas




P 0,238

■ No ■ Sí

# RESULTADOS

## Ingreso hospitalario



P 0,105

■ No ■ Sí

# RESULTADOS

La patología psiquiátrica más prevalente en la **pandemia** fue el **trastorno del estado del ánimo** (21%, n=4). En **prepandemia** fue el **TDAH** (18%, n=2) y **alteraciones de la conducta** (18%, n=2)

# CONCLUSIONES

- Los intentos autolíticos ocurrieron predominantemente en mujeres
- Durante la pandemia se vio un aumento estadísticamente significativo en el número de intentos autolíticos en comparación con los dos años previos a la pandemia