XXVI REUNIÓN PAMPLONA | 16 AL 18 DE JUNIO DE 2022 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE URGENCIAS DE PEDIATRÍA



COMUNICACIÓN CORTA

NIÑOS PORTADORES DE GASTROSTOMÍA, ¿POR QUÉ CONSULTAN?

Autores: Rodríguez del Rosario, Silvia¹; Goez Sanz, Carmen¹; Carranza Ferrer, Jorge¹; Izquierdo Herrero, Elsa¹; Ortega Vicente, Elena¹; Sánchez Abuín, Alberto².

Centros de trabajo: Servicio de Pediatría¹. Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Servicio de cirugía pediátrica². Hospital Clínico Universitario de Valladolid

INTRODUCCIÓN:

La gastrostomía endoscópica percutánea (PEG) supone una alternativa en pacientes que precisan nutrición enteral prolongada siendo la técnica de elección en niños con trastornos de la deglución, especialmente los asociados a patología neurológica.


OBJETIVOS:

 Describir las características de los pacientes portadores de PEG en nuestro hospital y analizar el manejo cuando han consultado en urgencias por problemas relacionados con la sonda.

METODOLOGÍA:

Estudio descriptivo de los pacientes pediátricos (<14 años) portadores de gastrostomía entre los años 2005 y 2021. Se recoge las características de los pacientes mediante el programa informático Jimena y se analizan las visitas a urgencias entre los años 2017 y 2021







XXVI REUNIÓN SEUP








N=36. Edad media 5,24







XXVI REUNIÓN SEUP










XXVI REUNIÓN SEUP 🕸









el **75%** En la causa subyacente fue la patología infecciosa (n=3)

En el **71,42%** los problemas fueron derivados por la presencia de **granulomas** (n=10), resolviéndose mediante la cauterización de nitrato de plata.

XXVI REUNIÓN SEUP 🔞









XXVI REUNIÓN SEUP





CONCLUSIONES:

- La presencia de complicaciones derivadas de la gastrostomía puede constituir una urgencia en función del tiempo transcurrido desde su colocación.
- Las más frecuentes son las relacionadas con el estoma y el manejo de la sonda.
- Es vital una celeridad en su atención para garantizar el mantenimiento de la fistula gastrocutánea.







