

XXVI | **REUNIÓN** PAMPLONA | 16 AL 18 DE JUNIO DE 2022

**SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
URGENCIAS DE PEDIATRÍA**



**SUPERVIVENCIA SIN EVIDENCIA:
Aprendiendo para el futuro**

Póster con defensa

Tratamiento con paracetamol, causa frecuente de intoxicación medicamentosa

Baquero Gómez, C; Torres Rico, M; Márquez Mira, P, Croche Santander, B, Bellido Gallego, C

Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva

Estudio observacional descriptivo y retrospectivo: intoxicación aguda por paracetamol seguimiento en 2 años.

5 pacientes. mediana edad 1,16 años

	Vía admon	Dosis Mg/kg	Niveles max Mcg/ml	Transaminasas max. AST/ALT U/L	Alt Coagulación
1	iv	100	1,2	2776/3064 48h	No
2	iv	140*	15,8	2166/1525 36h	Si
3	Vo	148	4,1	169/211 48h	No
4	iv	88	43	64/40 36h	No
5	iv	140	73	1341/465 12h	Si

* Fallo medro

80 % N-acetilcisteina

1 fallecimiento.sepsis

- Riesgo de intoxicación por paracetamol en pediatría. Clínica inicial inespecífica.
- Establecer un nuevo normograma para intoxicación iv. Nuevos criterios de tratamiento.
- Medidas implantadas en nuestro centro para evitar estas intoxicaciones