



SEUP

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
URGENCIAS DE PEDIATRÍA

BRONQUIOLITIS БРОНХИОЛИТ

ЧТО ТАКОЕ БРОНХИОЛИТ?

Это вирусная инфекция чаще всего встречающаяся у детей в возрасте до двух лет, сопровождающаяся затрудненным дыханием и, иногда, «свистящими» шумами в груди. Обычно начинается с кашля и насморка, через 3-4 дня появляется легочная недостаточность. Ребенок может быть раздражительным, меньше есть и возможна повышенная температура.

ЧТО ДЕЛАТЬ ДОМА?

- Держите ребенка сидя, так как это поможет ему лучше дышать.
- Промывания носа физиологическим раствором необходимы при наличии слизи, желательно перед едой.
- Чтобы ребенок не переутомлялся, кормления должны быть частыми и непродолжительными.
- Избегайте задымленных помещений.

КОГДА НЕОБХОДИМА НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ?

- Если у ребёнка резко ухудшается общее состояние, он становится раздражителен или сонлив.
- Если ребенок сильно устает во время кормления, почти не ест.
- Если кожный покров ребёнка становятся фиолетовым или бледным.
- Если сильно затруднено дыхание: ребенок дышит часто, раздувает ноздри, и напрягает мышцы живота, иногда грудная клетка опускается, и дыхание становится прерывистым.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- В настоящее время не существует лекарств, излечивающих бронхиолит.
- Симптомы бронхиолита могут сохраняться до 2-4 недель.
- У некоторых детей после перенесенного бронхиолита возникают последующие эпизоды дыхательной недостаточности с кашлем, которые напоминают первоначальные симптомы.