



SEUP

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
URGENCIAS DE PEDIATRÍA

CONVULSIÓN FEBRIL ФЕБРИЛЬНЫЕ СУДОРОГИ

ЧТО ТАКОЕ ФЕБРИЛЬНЫЕ СУДОРОГИ?

Это реакция мозга на высокую температуру, которая возникает у некоторых здоровых детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет. ФС почти всегда возникают в первый день высокой температуры.

Ребенок резко теряет сознание, тело напрягается и подергивается или, наоборот, обмякает. В это время рот ребенка багровеет, губы плотно смыкаются, зубы сжимаются, взгляд отсутствующий.

Обычно это длится не долго, менее 5 минут.

По окончании припадка ребенок обычно засыпает.

ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ ВО ВРЕМЯ ПРИПАДА?

- Уложите ребенка на бок для улучшения дыхания, подальше от травмирующих предметов.

- Не пытайтесь ничего класть в рот ребёнка.

- Если ребенок не принимал никаких жаропонижающих средств в течение последних 2 часов, вы можете дать поставить ему свечу с парацетамолом.

- Желательно, чтобы ребенка осмотрел врач, для постановки/ подтверждения диагноза. Для этого необходимо обратиться в ближайший медицинский центр или больницу.

КОГДА НЕОБХОДИМА НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ?

- Если приступ повторяется.

- Если ваш ребенок сонный, вялый или, наоборот, очень раздражительный.

- Если он жалуется на сильную головную боль, или у него открылась рвота.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Фебрильные судороги обычно не имеют опасных для здоровья последствий. После припадка ребенок будет в том же состоянии, что и раньше.

- Любая обычная инфекция (простуда, тонзиллит, гастроэнтерит), протекающая с высокой температурой, может вызвать фебрильные судороги.

- Они случаются редко, у 3-5% детей. Кроме того, после первого эпизода у каждого третьего ребёнка возможен повторный эпизод.

- В большинстве случаев дополнительного обследования не требуется.

- Дети с фебрильными судорогами не нуждаются в дополнительном лечении, отличном от лечения других детей с высокой температурой.