



SEUP

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
URGENCIAS DE PEDIATRÍA

TRAUMATISMO CRANEAL ЧЕРЕПНО-МОЗГОВАЯ ТРАВМА

ЧТО ТАКОЕ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВАЯ ТРАВМА?

Это травма или ушиб головы.

В это время у вашего ребенка нормальный неврологический осмотр, поэтому вы не проходите Требуется дохода.

ЧТО ДЕЛАТЬ ДОМА?

-Наблюдайте за ребенком в течение следующих 24 часов, следите, не возникают ли какие-либо осложнения. Ему необходимо находиться в тихом, спокойном месте под присмотром взрослых.

- Если ребенок сонливый, вялый, нужно дать ему возможность поспать, но необходимо будить его примерно каждые четыре часа, чтобы понять, насколько его реакции и поведение адекватны.

- Если у ребёнка болит голова, можно принять парацетамол или ибупрофен в обычных дозах.

-Если в течение двух часов нет рвоты, можно предложить ребёнку диетическую пищу в небольшом количестве.

- Через 24 часа после травмы можно вернуться к обычному ритму жизни.

КОГДА НЕОБХОДИМА НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ?

-Если ребенка повторилась рвота.

-Если у него сильная или прогрессирующая головная боль.

-Если ребенок сонный, вялый, долго спит или, наоборот, раздражительный.

- Если ребёнок делает странные произвольные движения, если у него появляется слабость, покалывание в конечностях, ему трудно ходить, он невнятно говорит или жалуется на плохое зрение, а также если замечен разный размер зрачков.

- Если вы заметили, что из носа или ушей выходит прозрачная жидкость или кровь.

- Неотложная медицинская помощь необходима при любом симптоме, который кажется вам странным, беспокоит вас, является нетипичным для ребёнка.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

-Большинство травм головы являются неопасными, не вызывают осложнений.

При незначительных ударах серьезные травмы головы случаются редко.

-Это нормально, если ребенок в первые часы напуган, не помнит момент травмы, у него болит голова или появляется рвота.

-В большинстве случаев даже без использования рентгена можно определить тяжесть полученной ребёнком травмы.