SEUP
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE URGENCIAS DE PEDIATRÍA

9 ACCIONES QUE NO HAY QUE HACER EN EL USO DE LA ECOGRAFÍA CLÍNICA EN URGENCIAS DE PEDIATRÍA

⊘ NO HACER

1. Tomar decisiones basadas en los hallazgos ecográficos sin tener en cuenta el contexto clínico del paciente
2. Dar por finalizada una ecografía clínica sin haber completado la sistemática de exploración
3. Utilizar la ecografía clínica sin tener la formación necesaria
4. Olvidar comparar las imágenes ecográficas dudosas con el lado contralateral o con zonas adyacentes a la lesión
5. Retrasar el inicio de las compresiones torácicas o interrumpirlo para la realización de ecografía clínica en la parada cardiorrespiratoria
6. Sacar conclusiones sobre función cardíaca o tamaño de cavidades con un solo plano ecocardiográfico
7. Considerar, en ecografía pulmonar clínica, que todas las consolidaciones ecográficas son neumonías
8. Descartar lesión intraabdominal ante un FAST negativo
9. Retrasar la realización de una TC craneal en un paciente con criterios de alto riesgo de lesión intracraneal para realizar una ecografía clínica de calota

Grupo de Trabajo de Ecografía Clínica-SEUP