




Primer episodio de dificultad respiratoria, ¿y si no es bronquiolitis?

Marta Conde Sendagorta, Lucía de Pablo Fernández, Pablo Gómez Roca, María Tejado Castillo, Gema Medina, María Fernández, Hospital Universitario Infanta Sofía

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO

La dificultad respiratoria es un motivo de consulta frecuente en urgencias pediátricas. El neumotórax es una entidad a tener en cuenta en el diagnóstico diferencial ante una auscultación asimétrica o un paciente inestable.

RESUMEN DEL CASO



COMENTARIOS

El neumotórax es una entidad poco frecuente en pediatría, especialmente fuera de periodo neonatal. La mayoría de ellos suelen ser simples, donde se puede mantener una actitud conservadora, sin embargo, si son de gran tamaño o provocan inestabilidad hemodinámica se convierten en una **emergencia vital**. En caso de estar indicado, el drenaje debe ser precoz para evitar un posible shock obstructivo, que supondría una disminución del retorno venoso con una consecuente disminución del gasto cardiaco.

Se debe tener un **alto nivel de sospecha** ante un episodio de **inicio brusco de dificultad respiratoria**, sobre todo si asocia **asimetría en la auscultación**. Una vez se sospeche esta patología, es de vital importancia la **comprobación de la estabilidad hemodinámica** mediante toma de constantes. En caso de inestabilidad hemodinámica está indicado el drenaje urgente con toracocentesis sobre el 2º espacio intercostal en línea medioclavicular (preferiblemente conectado a sello de agua), incluso sin confirmación radiológica.