

XXVII REUNIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE URGENCIAS DE PEDIATRÍA



SEUP

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
URGENCIAS DE PEDIATRÍA

CUIDÁNDONOS | CUIDÁNDOLOS

COMUNICACIÓN CORTA

Estudio descriptivo de pacientes politraumáticos en contexto de conductas autolesivas/autolíticas en un hospital de referencia de trauma pediátrico

Irene Ribas Torres, Miriam Morey Olivé, Sonia Cañadas Palazón, Sebastià González Peris, Ana Laín Fernández, Núria Worner Tomasa


Hospital Universitario Vall d'Hebrón

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO

- Incremento de la incidencia de pacientes politraumáticos en contexto de conductas autolesivas/autolíticas
- Analizar a los pacientes atendidos por código PPT secundarios a conductas autolesivas/autolíticas del 2018-2022
 - Características clínicas
 - Contexto psiquiátrico
 - Gravedad
 - Morbi-mortalidad



METODOLOGÍA



Estudio descriptivo,
restrospectivo,
unicéntrico del
2018-2022

RESULTADOS I

CARACTERÍSTICAS PACIENTES (n=10)

| | |
|------------------------------------|---|
| Edad | Mediana 13,5a (9-16) |
| Sexo | 1:1 |
| A. Psiquiátricos | 50% SI - 30% TEA - 10% Sd. Ansioso-depresivo - 10% Conductas autolíticas 50% NO |
| Seguimiento SM | 40% (80% de los pacientes con AP) |
| Tentativas suicidio previas | 20% |

CARACTERÍSTICAS SUCESO (n=10)

| | |
|------------------|---------------------|
| Mecanismo | Precipitación 80% |
| | Atropellamiento 10% |
| | Ahorcamiento 10% |


RESULTADOS II

| CARACTERÍSTICAS PPT (n=10) | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----|------|-------|
| Prioridad | (0,1) Paciente crítico 70% | | | |
| Manejo pre-hospitalario | Inmovilización raquis: 70% | | | |
| | IOT: 50% | | | |
| | Inestabilidad HD*: 80% | | | |
| | GCS <8: 50% | | | |
| | RCP: 10% | | | |
| Estabilización hospitalaria | IOT posterior: 10%. No extubaciones | | | |
| | Inestabilidad HD: 60% | | | |
| | RCP 10% | | | |
| Éxito | 10% | | | |
| Lesiones agudas (n=9) | SNC | C-R | ABD | LOCOM |
| | 33% | 67% | 67% | 89% |
| IQ/Rx interven* | 11% | 22% | 11%* | 67% |

| INGRESO HOSPITALARIO Y MORBILIDAD (n=9) | |
|---|--|
| Ingreso | Unidad: 89% UCI |
| | Mediana: 18d |
| Secuelas graves | 33% |
| | 2 radiculopatías (+/- uropatía secundaria) 1 hemiplejía |

RESULTADOS III

Gráfico I. Pacientes politraumatizados atendidos en Urgencias (2018-2022)



CONCLUSIONES

- Se objetiva un incremento claro en los últimos años de PPTs en contexto de conductas autolesivas/autolíticas dentro del total de PPTs (último año 14,6%).
- Destaca que únicamente la mitad presentan antecedentes psiquiátricos previos y solo un 20% tentativas suicidas previas.
- Pacientes críticos en el 70% de los casos, con ingresos en UCI prolongados y altos requerimientos quirúrgicos de urgencia, con mortalidad 10% y 33% de secuelas graves.
- Importancia de los sistemas de detección ambulatoria y de los signos de alarma, sobretodo en la población más vulnerable (adolescentes y pacientes con patología psiquiátrica)

La investigación sobre las gemelas de 12 años que se precipitaron desde un tercer piso en Sallent apunta a un salto voluntario

AGENCIAS/ NOTICIA / 22.02.2023 - 17:48H



- Los Mossos creen que saltaron por problemas familiares.
- Se encontraron dos cartas manuscritas por ellas y dos sillas donde se habrían subido.

GIRONA

Una niña hospitalizada en estado crítico tras caer de un segundo piso en Maçanet de la Selva

- Mossos investigan los hechos, que no se descarta que puedan responder a un intento de suicidio