

# PENSANDO EN POSITIVO

I. Medina Junquera, P. Lapunzina Soler, M. Caballero Aldunate, B. Benito Hernández, N. De la Esperanza Piñeiro, D. Carranza Rojo

## INTRODUCCIÓN

- PANDEMIA → ↑ 50% de trastornos de salud mental , ↑ Urgencias pediátricas por trastornos funcionales.
- Trastornos neurológicos funcionales: afectan a sensibilidad o función motora, no pueden ser explicados por una enfermedad neurológica u otro trastorno mental y causan un sufrimiento emocional o disrupción social o escolar significativos.



- **Niño de 11 años.** Sensación **vertiginosa** con **desequilibrio** (12 horas) + pérdida sensibilidad y fuerza súbitas de extremidades inferiores (5 horas)

- **AP:** Crisis de ansiedad hace 6 meses.



- **EF:** Test de Hoover +, Hallazgos incongruentes y variables en el tiempo respecto a la fuerza y la sensibilidad en EEII, pérdida de sensibilidad simétrica por debajo de la ingle, con reflejos simétricos y normales.



- **T. NEUROLÓGICO FUNCIONAL CON SÍNTOMAS MIXTOS**



- **Niña de 11 años.** Disminución de agudeza visual (8 meses)

- **AP:** Estrabismo. Síndrome Duane tipo III

- **EF:** Oftalmoparesia atribuible al síndrome de Duane Agudeza visual variable y exploración no concordante.

- **PPCC:** RM cerebral y potenciales evocados visuales sin alteraciones.

- **T. NEUROLÓGICO FUNCIONAL CON SÍNTOMA SENSITIVO ESPECIAL (VISUAL)**



## COMENTARIOS

- Dado el incremento de los trastornos neurológicos funcionales en la población infantojuvenil, es importante que conozcamos su forma de presentación para el diagnóstico diferencial en Urgencias.
- Cabe recalcar la relevancia del diagnóstico por inclusión de **síntomas positivos** y no solo por exclusión, evitando pruebas complementarias innecesarias.