

XXVII



REUNIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE URGENCIAS DE PEDIATRÍA



SEUP

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
URGENCIAS DE PEDIATRÍA

CUIDÁNDONOS | CUIDÁNDOLOS

COMUNICACIÓN ORAL CORTA

Laringitis aguda en menores de 6 meses: ¿Ingreso justificado?

E. Legarda-Ereño Rivera, N. Izaguirre Díaz, JA. Muñoz Bernal, A. Cámara Otegui, I. Olaciregui Echenique, C. Calvo Monge.

Urgencias de Pediatría. Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Donostia. San Sebastián. Guipúzcoa.

INTRODUCCIÓN

- La laringitis aguda es un motivo de consulta habitual en las urgencias pediátricas (3% de las consultas en nuestra unidad)
- En la mayoría de guías de práctica clínica la edad <6 meses es criterio absoluto o relativo de ingreso.
- En nuestra práctica prevalece la **gravedad** sobre la edad para decidir el ingreso hospitalario.



OBJETIVO

1. Describir el manejo y posterior evolución de los lactantes < 6 meses con laringitis aguda que acudieron a Urgencias de Pediatría
2. Determinar si el manejo sin ingreso es seguro.





Estudio descriptivo y retrospectivo

METODOLOGÍA



Lactantes
<6 meses



2018-2022



ESCALA DE WESTLEY

- Leve: 0-2
- Moderada 3-7
- Grave ≥ 8




DEXAMETASONA

- Dosis baja: $<0,2\text{mg/kg}$
- Dosis moderada : 0,2-0,5mg/kg
- Dosis alta: $>0,5\text{mg/kg}$.


Mediana de edad: 4 meses

RESULTADOS




2,8% <6 meses

n=129




4596 pacientes

NO
COMPLICACIONES
ASOCIADAS




CRISIS LEVES



CRISIS MODERADAS

- 100% Corticoide dosis media-alta
- 85% Adrenalina nebulizada

EVOLUCIÓN



■ Alta a domicilio ■ Ingreso

31 pacientes (25%)
tras estancia en OUP.

RESULTADOS II

*14 (10,8%) pacientes reconsultaron en Urgencias de Pediatría o Atención Primaria, solo 1 por empeoramiento clínico

INGRESOS: 6 pacientes (4,6%)



2 en Planta de Hospitalización (edad)




4 en UCIP (necesidad de varias dosis de adrenalina)



TODOS
EVOLUCIÓN
FAVORABLE



RESULTADOS III



CONCLUSIONES


La laringitis aguda es infrecuente en pacientes <6 meses.

La mayoría de los pacientes atendidos presentaron:

- Cuadros leves
- Respondieron adecuadamente al tratamiento
- Se pudieron manejar de forma ambulatoria sin complicaciones
- No patología asociada de gravedad



Todos los pacientes atendidos tuvieron una evolución favorable



- Gravedad > Edad para decidir ingreso hospitalario
- Uso de corticoides a dosis altas en laringitis leves!





Osakidetza
salud, más que nunca

Muchas gracias!

Eskerrik asko!

XXVII REUNIÓN



SEUP
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
URGENCIAS DE PEDIATRÍA

