


MENINGITIS Y MENINGOENCEFALITIS

- O₂ 100%, monitorización
- Estabilización según aproximación ABCDE
- Pruebas: posponer PL si persiste inestable. Valorar necesidad de TC craneal
- Dexametasona 0,15 mg/kg IV previo a ATB, si factor de riesgo de meningitis por *H. influenzae*
- ATB: cefotaxima IV 75 mg/kg (máx. 2 g) + vancomicina IV 15 mg/kg (máx. 1 g), si no exantema purpúrico
- Si sospecha de encefalitis herpética, aciclovir IV 10-15 mg/kg (10 mg/kg si >12 años)
- Ver texto para pautas ATB y aciclovir en neonato



PL: punción lumbar; ATB: antibioterapia; HRF: hemograma, fórmula y recuento leucocitario; BQ: bioquímica básica; PCR: proteína C reactiva; PCT: procalcitonina; rt-PCR: reacción en cadena de la polimerasa; HTIC: hipertensión intracraneal; VDVP: válvula de derivación ventrículo-peritoneal; TCE: traumatismo craneoencefálico; LCR: líquido cefalorraquídeo; EEG: electroencefalograma; m: meningitis; MSE: Meningitis Score for Emergencies; TBC: tuberculosis.